



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ранней диагностики и лечения
онкологических заболеваний

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ОБСЛЕДОВАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРАМАГНИТНЫХ КОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ.

Вам вводился парамагнитный контрастный препарат Омнискан (объём введения указан в шапке заключения специалиста).

В некоторых случаях, после введения препарата может развиваться отсроченная аллергическая реакция (наиболее частое время риска – через 2 и через 8 часов после выполнения инъекции).

Для профилактики осложнений, связанных с введением рентгенконтрастного препарата рекомендуется:

- Употреблять больше жидкости (желательно, негазированной питьевой воды).
- При возникновении признаков аллергической реакции: тошнота, рвота, удушье, кожный зуд, появления кожной сыпи рекомендуется самостоятельно принять антигистаминный (противоаллергический) препарат: Супрастин, Пипольфен, Диазолин или аналогичный (в дозировке, указанной в прилагаемой к нему инструкции).
- При ухудшении самочувствия вызвать скорую помощь (сообщив врачу бригады скорой помощи об обследовании с применением рентгенконтрастного препарата и его названии).

При проведении последующих диагностических исследований обязательно сообщать врачу и среднему медперсоналу о случаях аллергии на контрастные вещества (с указанием их названия).